

## PAS, cvičení, 8. 11. 2024

- Na intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$  vykreslete funkce  $f_i(x) = x^i$  pro  $i \in \{1, 2, \dots, 6\}$ .  
Do grafu přidejte legendu.

Návod: `convert(..., string), seq`

- Pomocí `proc` a `if` zapište funkci `mymax(a,b)`, která vrátí větší z čísel  $a, b$ . Pokud jsou  $a$  a  $b$  stejná, vrátí  $a = b$ .
- Napište funkce `myfact(n)`, resp. `myfact2(n)` pro výpočet faktoriálu pomocí `while`, resp. `for` cyklu.
- Pomocí `for` cyklu napište funkci `nadruhou()`, která vrátí všechny argumenty umocněné na druhou, např. jako seznam. Návod: `nargs, args[i], op(), []`.
- Pomocí `for` cyklu vypište násobky 5 od 0 do 100, tj. 0, 5, 10, 15, ... 100.  
Zkuste nepoužívat násobení.
- Pomocí `for ... in` napište funkci `mmax()`, která vrátí maximum ze všech argumentů.  
Návod: `args`.
- Vygenerujte množinu bodů  $A_k = [x_k, y_k]$  tak, že  $A_1 = [0, 0]$  a

$$A_k = [x_{k+1}, y_{k+1}] = \begin{cases} [0, 0.16y_k] & s \ p = 5\% \\ [0.85x_k + 0.04y_k, -0.04x_k + 0.85y_k + 1.6] & s \ p = 81\% \\ [0.2x_k - 0.26y_k, 0.23x_k + 0.22y_k + 1.6] & s \ p = 7\% \\ [-0.15x_k + 0.28y_k, 0.26x_k + 0.24y_k + 0.44] & s \ p = 7\% \end{cases}$$

Tuto množinu vykreslete pomocí zelených bodů a bez os.

Návod: Náhodné číslo mezi 1 a 100 se vygeneruje pomocí `rand(1..100)`.  
(Např.  $p = 5\%$  označuje s pravděpodobností 5%).

- Vyřešte následující dvě soustavy rovnic:

$$\begin{array}{rcl} x & -y & +2z = 3 \\ 2x & & +z = 1 \\ & -2y & +3z = 5 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} x & -y & +2z = 3 \\ 2x & & +z = 1 \\ x & -2y & +3z = 5 \end{array}$$

Liší se nějak struktura řešení?

- Vyřešte diferenciální rovnici

$$y'(x) + (1/x) * y(x) = 1.$$

Dále tuto rovnici řešte s počáteční podmínkou  $y(1) = -1$ .  
Ověřte správnost řešení (dosad'te řešení do rovnice).

- Řešte ODR  $y''(x) + y(x) = \sin(x)$  s počátečními podmínkami  $y(0) = 0$  a  $y'(0) = 1$ .  
Řešení vykreslete na intervalu  $\langle 0, 4\pi \rangle$ .